

スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する
一般化学物質の候補物質について

1. 生態影響に関する有害性データの信頼性評価

今年度のスクリーニング評価では暴露クラス 1~4 の物質について、「化審法における生態影響に関する有害性データの信頼性評価等について¹(以下、『信頼性評価手法』と記載)」に従い生態影響に関する有害性データの収集及び信頼性確認を実施している。

信頼性評価手法に明記されている有害性データの収集範囲を以下に示す。

- 3.1 詳細な信頼性評価を必要としない有害性データの収集範囲と信頼性評価
化審法審査済みの有害性データ（新規及び既存化学物質）
環境省（庁）等、国が実施した生態影響試験結果のうち、既に毒性値の信頼性評価がされているもの（生態リスク初期評価での信頼性が評価済みの有害性データ等）
農薬取締法 水産動植物登録保留基準設定に用いられた有害性データで、指定試験法の条件を満足するもの
米国環境保護庁（US EPA）Pesticide Ecotoxicity Database に登録された有害性データ
OECD SIDS レポート（SIDS Initial Assessment Report）で評価された有害性データ
欧州連合（EU）「IUCLID」（International Union Chemical Information Database）に登録された有害性データ
欧州連合（EU）ECHA（European Chemicals Agency）の Information on Registered Substances に登録された有害性データ
環境省 化学物質の環境リスク評価（生態リスク初期評価）で信頼性が評価された毒性値
EU ECB(European Chemicals Bureau) リスク評価書（EU Risk Assessment Report)で信頼性が評価された有害性データ
（独）製品評価技術基盤機構 化学物質の初期リスク評価書又は化学物質有害性評価書に採用された有害性データ

¹化審法における生態影響に関する有害性データの信頼性評価等について(平成 23 年 9 月 15 日):
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/reliability_criteria04.pdf

欧州産業界 ECETOC の水生生物毒性データベース (ECETOC Aquatic Toxicity : EAT) に登録された有害性データ

WHO/IPCS 環境保健クライテリア (EHC) に採用された有害性データ

WHO/IPCS 国際簡潔評価文書 (CICAD) に採用された有害性データ

Japan チャレンジプログラムで取得された有害性データ

3.2 詳細な信頼性評価を必要とする有害性データの収集範囲と信頼性評価 事業者から報告された有害性データ (実測又は学術論文等の有害性データ)

3.1 に該当するデータを除く。

国内外の政府機関等で生態影響試験が実施されているが、信頼性評価が行われていない

- ・ 環境省生態影響試験事業で信頼性の確認がされていない有害性データ
- ・ 濃縮度試験予備試験での有害性データ
- ・ 既存点検で審査が実施されていない有害性データ

国内外の政府機関等から有害性データは公表されているが、信頼性評価が行われていない又は行われているか不明

- ・ カナダ環境省/保健省 Assessment Report Environment Canada : Priority Substance Assessment Reports (優先物質評価報告書)
- ・ Australia NICNAS Priority Existing Chemical Assessment Reports
- ・ WHO/FAO Pesticide Data Sheets (PDSs)
- ・ BUA Report

以下の生態毒性データベース等から得られる学術論文等での有害性データ

- ・ US EPA 生態毒性データベース「AQUIRE」(Aquatic toxicity Information REtrieval)
- ・ OECD QSAR Toolbox に含まれる生態毒性データベース (Aquatic OASIS)

有害性データが得られた場合、信頼性評価手法に従い試験法、生物種等を確認した上で、有害性データの信頼性を以下の4ランクに区分する。このうち、信頼性ランク1又はランク2とされた毒性値はPNEC値算出のキースタディの候補とし、スクリーニング評価に用いられる。

【ランク 1 信頼性あり（制限なし）】

- ・ 指定試験法を用いて、GLP（Good Laboratory Practice、優良試験所基準）に従って試験が実施されている。

かつ

- ・ 被験物質に関する情報（純度、成分等）が明記されており、含まれている不純物等の成分は毒性に影響しないと考えられる。被験物質の純度が 95%以上であれば、不純物等の成分は毒性に影響を与えないとみなす。

【ランク 2 信頼性あり（制限付き）】

- ・ 指定試験法からの逸脱や不明な点が若干あるが、総合的に判断して信頼性がある。

かつ

- ・ 被験物質に関する情報（純度、成分等）が明記されており、含まれている不純物等の成分は毒性に影響しないと考えられる。被験物質の純度が 95%以上であれば、不純物等の成分は毒性に影響を与えないとみなす。

【ランク 3 信頼性なし】

- ・ 試験方法は指定試験法からの逸脱が著しく、指定試験法への適合性が判断できない。

または

- ・ 被験物質に関する情報（純度、成分等）が明記されているが、不純物が毒性値に影響している可能性が否定できない。

【ランク 4 評価不能】

- ・ 試験方法に不明な点が多く、指定試験法への適合性が判断できない。

または

- ・ 被験物質に関する情報（純度、成分等）が明記されておらず、その妥当性が判断できない。

2. 信頼性評価の結果

平成 30 年度暴露クラス 1~4 の一般化学物質、及び人健康のみに係る優先評価化学物質（以下で片側優先物質という）について、暴露クラスが大きい物質から基本的には CAS 番号を用いて有害性データを収集し、得られたデータの信頼性評価を実施している。

信頼性評価手法に示す有害性データの収集範囲を検索したが有害性データが得られなかった物質は、一般化学物質では 11 物質あった。

さらに、有害性データは得られているが信頼性が低く、結果として有害性クラスを付与するに足るデータが得られない物質は、一般化学物質で 1 物質あった。












3. 今年度のスクリーニング評価においてデフォルト適用を保留する物質

昨年度までは、デフォルト適用の検討を行った結果、「評価単位の検討対象」、「無機金属化合物」、「常温でガス状の物質」等については取り扱い方針の検討が必要との理由からデフォルト適用を保留してきた。今年度は、これらの物質が経済産業省により「組成確認が必要な物質」等としてスクリーニング評価の対象外と整理されたため、デフォルト適用の検討からは除外している。

今年度、本検討会の有害性評価（スク評）ワーキンググループにおいてガス状物質および水相から揮発しやすい物質²の有害性評価方針を検討することとなっている。そのため、上記の合計 12 物質のうち、水相から揮発しやすい物質に該当する 1 物質については、今年度デフォルト適用を行わないこととした。

² 該当する物質は、「ヘンリー定数が 100 Pa·m³/mole 以上では 3~4 時間で 50%以上が水相から揮発」(OECD GD23)を参考として選定する。

表1 平成30年度デフォルト適用候補となる物質(11物質)

番号	CAS番号	MITI番号(官報公示整理番号)	白通し番号	名称	構造	平成30年度登録クラス(生態)		デフォルト適用検討の理由		参考:QSAR予測結果			
						難分解性または分解性不明	良分解性	有害性情報なし	情報の信頼性なし	ECOSAR ¹		KATE ²	
										甲殻類急性(mg/L)	魚類急性(mg/L)	甲殻類急性(mg/L)	魚類急性(mg/L)
1		2-3231	964	エチル = 水素 = スルファート			3	○		判定不能	判定不能	判定不能	判定不能
2	90-17-5			2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate		難(デフォルト)	4	○		5.04	2.96	判定不能	判定不能
3	110-98-5			ジプロピレングリコール		難	4	○		11500	25800	判定不能	43000
4	820-66-6			2-[ジメチル(オクタデカン-1-イル)アンモニオ]アセテート		難(デフォルト)	4	○		判定不能	判定不能	判定不能	判定不能
5	2500-83-6			4,7-Methano-1H-inden-5-yl 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, 5-acetate			4	○		15.6	8.23	11.0 判定留意(麻酔作用を持つ部分構造を含む)	9.20 判定留意(麻酔作用を持つ部分構造を含む)
6	2510-99-8			Benzeneacetic acid, alpha-methyl-, ethyl ester		難(デフォルト)	4	○		11.8	6.3	判定不能	7.5
7	4316-66-9			メタクリロキシエチルジエチルメチルアンモニウムメチルサルフェート			4	○		866	1200	logP x	logP x
8	5182-36-5			2,4,6-トリメチル-4-フェニル-1,3-ジオキサン		難(デフォルト)	4	○		10.8	17.2	9.3	12
9	25268-73-9			2-[[[ドデカノイルオキシ]メチル]-2-エチルプロパン-1,3-ジイル=ジドデカノアート		難(デフォルト)	4	○		logP x	logP x	判定不能	判定不能
10	37203-76-2			Phosphoric acid, ethyl ester			4	○		判定不能	判定不能	判定不能	判定不能
11		2-3919	5165	3-ペンチルオキシプロパン-1,2-ジオール		良	4	○		783	1540	230	3000

*1 ECOSAR v1.11 により算出。魚類エンドポイント: Fish 96h LC50、甲殻類エンドポイント: Daphnid 48h LC50、logP は KowWin v1.68 を使用。

*2 KATE on PAS により算出。魚類エンドポイント: Fish 96h LC50、甲殻類エンドポイント: Daphnid 48h EC50、logP は KowWin v1.68 を使用。